

Písemka na opakování Analytické geometrie, Oktáva 2015/2016

Skupina A

Příklad 1

Určete obecnou rovnici přímky p tak, aby byla rovnoběžná s přímkou $q: x=1+3k, y=2+k$ a procházela bodem $A[1;2]$.

Obecná rovnice přímky je rovnice $ax + by + c = 0$, kde koeficienty a a b jsou dány normálovým vektorem přímky (vektorem kolmým na směr přímky), tedy $\vec{n} = (a; b)$ zadává směr přímky a koeficient c určuje umístění přímky v prostoru.

Přímka p rovnoběžná s q musí mít stejný směr (normálový vektor), jen jiné umístění. Přímka q je zadána parametricky, máme tedy její směrový vektor, jehož složky tvoří násobky koeficientu k . Je tedy $\vec{s}_q = (3; 1)$.

Hledáme normálový vektor, který je k \vec{s}_q kolmý. Jedním z možných kolmých vektorů je $\vec{n}_q = (-1; 3)$. Jelikož $p \parallel q$, musí $\vec{n}_q = \vec{n}_p$. Dosadíme do rovnice: $-x + 3y + c = 0$. Směr přímky je určen, umístění v prostoru určuje podmínka, že $A \in p$. Dosadíme bod A do rovnice a dopočítáme koeficient c . $-1 + 3 \cdot 2 + c = 0$, tedy $c = -5$.

Řešení: $p : -x + 3y + -5 = 0$

Poznámka: bylo také možné si všimnout, že bod $[1;2]$ leží na přímce q , jelikož je přímo zadaný v jejím parametrickém vyjádření, takže stačilo převést q do obecného tvaru, jelikož $p=q$.

Příklad 2

Určete vzdálenost přímky $p: x=3k, y=2-2k$ od bodu $[3;2]$.

Přímka je zadána parametrickou rovnicí. Existuje vzorec pro vzdálenost bodu od přímky, kde do levé strany obecné rovnice přímky dosadíme souřadnice bodu a podělíme délkou normálového vektoru přímky, z výsledku bereme absolutní hodnotu (vzdálenost nemůže být záporná).

$$d(A; p) = \frac{|a \cdot x_A + b \cdot y_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ pro } A[x_A; y_A], p: ax + by + c = 0$$

Převědeme rovnici na obecnou buď sečtením tak, aby se odečetla k , nebo nalezením kolmého vektoru ke směrovému a dosazením bodu. Každopádně: $2x + 3y - 6 = 0$. Dosazením do vzorce získáváme, že délka je přibližně 1,66.

Kdo si nepamatuje vzorec, ví, že vzdálenost bodu od přímky je délka úsečky dané oním bodem a patou kolmice z bodu vedené k přímce. Určíme tedy kolmici k procházející bodem $A=[3;2]$, například obecnou rovnicí. Jelikož směrový vektor kolmice k musí být kolmý na směrový vektor přímky p a směrový a normálový vektor téže přímky jsou na sebe kolmé, pak normálový vektor kolmice k může být totožný se směrovým vektorem přímky p . Proto $3x - 2y + c = 0$. Dosazením bodu A dostáváme koeficient c a tedy $k : 3x - 2y - 5 = 0$.

Stejně dobře bylo možné si říci, že směrový vektor přímky k kolmý na směrový vektor přímky p je třeba (2;3) a proto parametrická rovnice kolmice je $k : x = 3 + 2k, y = 2 + 3k$.

Tak jako tak najdeme průsečík $k \cap p$ pomocí soustavy dvou rovnic pro přímky p a k . Bod $P = [\frac{27}{13}; \frac{8}{13}]$;

$$\text{Stačí určit } |AP| = \sqrt{(3 - \frac{27}{13})^2 + (2 - \frac{8}{13})^2} \doteq 1,66$$

From: <https://old.gml.cz/wiki/> - GMLWiki

Permanent link: <https://old.gml.cz/wiki/doku.php/matematika:analytgeom:opakovacipisemka?rev=1441693219>

Last update: 08. 09. 2015, 08.20

